

作物の
水分バランスを
調節する



Greenstim[®]

作物の水分バランスを調節する
グリーンステム

500g

輸入元



丸紅株式会社

東京都千代田区大手町1-4-2

水分ストレスから作物を守る

Greenstim[®]

グリーンステム[®]

裂果

高温/低温障害

凍霜害

乾燥

塩害

しおれ

果皮障害

空洞果

す入り

チップバーン

着果率、着花率向上

...ほか

使用量・使用時期及び使用方法

対象作物		使用目的	使用時期	使用方法	使用量 (10アールあたり)	
果樹類 (おうとう・りんご・ブルーネ・ ぶどう・もも・なし・かき・ 柑橘等)		低温・高温・凍 霜害・塩害等の 水分ストレスに よる生育障害軽 減	生育期 または収穫期	葉面散布 または 土壌灌注 (2~3週間間隔)	果樹類	350~500g
野菜類 (トマト・ミニトマト・ナス・ ピーマン・パプリカ・キュウリ・ 大根・ばれいしょ等)			(野菜類の場合 は定植後から収 穫終了まで)		野菜類	葉面散布の場合 200g 土壌灌注の場合 300g
果樹類	おうとう・ぶどう・ かき・柑橘等	過剰水分吸収に よる果実品質の 劣化軽減	果実の着色初期 から収穫期		果樹類	350~500g
	りんご・もも・なし・ ブルーネ等		幼果期あるいは 果実肥大期			

特長、作用機作

- ・水分ストレス(高温、低温、塩害、乾燥害及び凍霜害等)から作物を守り、減収の軽減、秀品率の維持に寄与します。また、過剰な水分吸収による果実の裂果を軽減します。
- ・てんさいから抽出したグリシンペタインが成分なので、環境、使用者、生産物に安全です。
- ・葉面から吸収され、24時間以内には植物全体に移行し、代謝されることなくそのまま各部位に留まり、効果が2~3週間持続します。植物細胞の浸透圧を調節し、環境ストレスを抑制します。

使用上の注意

- ・散布液がしたたる程度に作物全体に散布する。
- ・農薬あるいは他の液肥と混用する場合は予め少量を溶解して凝集、葉害等がないか確認する。
- ・葉害が出やすい農薬との混用は避ける。

保管上の注意

- ・室温で乾燥した場所に保管する。
- ・吸湿性が高いので使用後は袋のチャックをしっかりと閉める。

販売元

輸入元 **丸紅株式会社**

無機・農業化学品部
東京都千代田区大手町1丁目4番2号
Tel: 03-3282-4128